

DESCRIPTIONS DE QUELQUES LONGICORNES DE L'AFRIQUE

PAR ETIENNE DE BREUNING

Grâce à l'amabilité de Monsieur le Prof. Gestro, je peux examiner au cours de mes études sur les Longicornes, quelques individus indéterminés du Musée Civique de Gênes, parmi les quels se trouvent plusieurs espèces inédites. Ces espèces ont été recueillies par le Marquis Saverio Patrizi et j'en donne ici les descriptions.

1. *Prosopocera* (sous-genre *Timoreticus* Per.) ⁽¹⁾ *patrizii* nov.

Stature très allongée, parallèle; le front à peine convexe, (♀ ♀); les joues très courtes, moins longues que la moitié des lobes inférieurs des yeux; ceux-ci plus longs que larges; les antennes de la longueur du corps (♀ ♀); leur troisième article beaucoup plus long que le quatrième; les tubercules antennifères peu élevés; le pronotum sans épine latérale, son sillon transversal antérieur droit, profond; les élytres ponctués assez grossièrement à la base, très finement à la moitié postérieure.

Brun-rougeâtre, entièrement couvert d'une pubescence gris-blanchâtre; sur les élytres une tache brun-noirâtre commune à la suture après l'écusson. Long 17 mm, larg 5 ³/₄ mm. ♂ inconnu.

Type: 1 ♀ du Jubaland: Margherita, au Musée Civique de Gênes.

(1) Quant aux caractères du genre et sous-genre je renvoie le lecteur à mes études monographiques des tribus des *Prosopocerini* et *Trapocephalini* qui paraîtront sous peu.

2. *Prosopocera* (sous-genre **Timoreticus** Per.) **propinqua** nov.

Très voisin de *patrizii* mihi mais: les joues de la longueur des lobes inférieurs des yeux; ceux-ci à peine plus longs que larges; antennes de trois quarts plus longues que le corps ($\sigma\sigma$), leur troisième au cinquième articles très légèrement grossis ($\sigma\sigma$); élytres finement ponctués, même à la base.

Noir, entièrement marmoré de jaunâtre et de gris; sur chaque élytre deux très petites taches noires, une au bord marginal à la fin du quart basilaire, l'autre au milieu du disque à la fin du tiers basilaire. Long 13 mm, larg 4 mm. ♀ inconnue.

Type: 1 ♂ du Jubaland: Margherita, au Musée Civique de Gênes.

3. *Prosopocera* (sous-genre **Alphitopola** Thoms.) **robecchii** Gestro m. **albipennis** nov.

Comme la forme typique, mais la bande longitudinale suturale brune des élytres réduite à une petite tache autour de l'écusson, qui lui aussi, reste brun.

Type: 1 ♀ de la Somalie italienne: Ischia - Baidoa, au Musée Civique de Gênes.

4. *Prosopocera* (sous-genre **Alphitopola** Thoms.) **patriziana** nov.

Stature allongée, assez large; le front à peine convexe ($\sigma\sigma$); antennes de la longueur du corps ($\sigma\sigma$); les joues un peu plus courtes que les lobes inférieurs des yeux, ceux-ci un peu plus longs que larges; pronotum cylindrique, sans épine latérale, à peine élargi aux côtés; son sillon transversal antérieur peu profond, courbé distinctement au milieu du disque; élytres parallèles, finement ponctués sur toute leur étendue.

Noir, entièrement marmoré de jaune-brunâtre et de blanc, moucheté de brun-foncé vers les bords latéraux des élytres; chaque élytre en outre pourvu de deux petites taches noires, une au bord marginal à la fin du quart basilaire, l'autre sur le disque un peu avant le milieu: le dessous du corps marmoré de jaune-brunâtre et de blanc-jaunâtre; jambes et antennes couvertes d'une pubescence jaune grisâtre. Long 21 mm, larg 7,5 mm ♂ inconnu.

Type: 1 ♀ du Jubaland, au Musée Civique de Gênes.

5. **Prosopocera** (sous-genre **Alphitopola** Thoms.) **parvula** nov.

Très voisin de *patriziana* mihi, mais stature plus petite, plus étroite; antennes à peu près d'un quart plus longues que le corps (♂♂), non grossies; joues moins longues que la moitié des lobes inférieurs des yeux; élytres beaucoup plus grossièrement ponctués à la moitié basilaire.

Brun-rougeâtre, entièrement marmoré de gris et de blanc-jaunâtre, cette dernière couleur plus dense et ainsi plus apparente sur le disque des élytres à leur milieu et au commencement du quart apical. Long 10 mm, larg. 3 mm. ♀ inconnue.

Type: 1 ♂ du Jubaland, Margherita, au Musée Civique de Gènes.

6. **Chariesthes** (sous-genre **Chariesthes** Chevrl.) **somaliensis** nov.

Stature assez allongée; antennes à peine de moitié plus longues que le corps (♀♀), le scape sans cicatrice; la base du pronotum trilobée; élytres parallèles, la saillie prosternale très étroite, moins haute que les hanches.

Brun-rougeâtre, entièrement couvert d'une pubescence brun-jaunâtre; le fond (brun-rougeâtre) des élytres se présentant à la moitié apicale sous forme d'étroites bandes formant grillage, au milieu comme une étroite bande transversale fort dentelée et à la moitié basilaire comme deux étroites bandes annulaires, une à côté de l'écusson, l'autre sur le disque à la fin du quart basilaire. Le dessous, jambes et antennes rouge, couverts d'une pubescence éparse, jaunâtre. Long 9,5 mm, larg 3,5 mm. ♂ inconnu.

Type: 1 ♀ de la Somalie italienne: Piana di Fungalango, au Musée Civique de Gènes.

7. **Chariesthes** (sous-genre **Chariesthes** Chevrl.) **gestroi** nov.

Très voisin de *somaliensis* mihi mais: la stature un peu plus courte, les élytres moins parallèles. Tête, pronotum et écusson jaune-verdâtre, sauf une étroite bande longitudinale brun-rougeâtre au milieu du pronotum, qui n'atteint ni sa base ni son bord antérieur; élytres jaune-blanchâtre, leur base et sur chacun sept taches rondes jaune-verdâtre, largement cernées de brun-rougeâtre:

la première au milieu du disque à la fin du quart basilaire, la deuxième juste après elle, près de la suture, la troisième et la quatrième, une à côté de l'autre au milieu, (une au milieu du disque. L'autre près du bord marginal) la cinquième et sixième au commencement du quart apical (une près de la suture, l'autre près du bord marginal), la septième au sommet; une huitième tache à peine indiquée après le calus huméral. Long 8 mm, larg 3 mm. ♀ inconnue.

Type: 1 ♂ du Jubaland: Margherita, au Musée Civique de Gênes.
